□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□9kg□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

STEP **1**	エンレスト錠100mg、4錠を乳鉢に取り、乳棒を用いて細かい粉状になるまで粉砕します。	
STEP **2**	メスシリンダーを用い、単シロップの必要量100mLの1/3量を加えて10分間混和します。	
STEP **3**	単シロップの必要量100mLの2/3量を加えて10分間混和し、懸濁液（4mg/mL）とします。	
STEP **4**	清潔なポリプロピレン（PP）製ボトルに調製した懸濁液を移します。ボトルの口または表面に液が残っていないことを確認し、キャップをしてください。 最後に、ボトルをよく振り混ぜてください。	

Image

STEP **1**



エンレスト錠100mg、4錠を乳鉢に取り、
乳棒を用いて細かい粉状になるまで粉砕します。

STEP **2**

メスシリンダーを用い、単シロップの必要量100mLの1/3量を加えて
10分間混和します。

STEP **3**

単シロップの必要量100mLの2/3量を加えて10分間混和し、
懸濁液（4mg/mL）とします。

STEP **4**

清潔なポリプロピレン（PP）製ボトルに調製した懸濁液を移します。
ボトルの口または表面に液が残っていないことを確認し、
キャップをしてください。
最後に、ボトルをよく振り混ぜてください。

□□□