□□□□□□□□

□□□□□□
□□□□□□□□

□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□12 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□75□600mg□2□□4□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□IgE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□**1**□□□□□

4□□□□□

Image

投与前の血清中総IgE濃度(IU/mL)	体重(kg)									
	≥20~25	>25~30	>30~40	>40~50	>50~60	>60~70	>70~80	>80~90	>90~125	>125~150
≥30~100	75mg	75mg	75mg	150mg	150mg	150mg	150mg	150mg	300mg	300mg
>100~200	150mg	150mg	150mg	300mg	300mg	300mg	300mg	300mg	450mg	600mg
>200~300	150mg	150mg	225mg	300mg	300mg	450mg	450mg	450mg	600mg	
>300~400	225mg	225mg	300mg	450mg	450mg	450mg	600mg	600mg		
>400~500	225mg	300mg	450mg	450mg	600mg	600mg				
>500~600	300mg	300mg	450mg	600mg	600mg					
>600~700	300mg		450mg	600mg						
>700~800										
>800~900										
>900~1,000										
>1,000~1,100										
>1,100~1,200										
>1,200~1,300										
>1,300~1,500										

4週間毎投与の表に該当しない場合には
2週間毎投与の表に従い投与すること

2□□□□□

Image

投与前の血清中総IgE濃度(IU/mL)	体重(kg)									
	≥20~25	>25~30	>30~40	>40~50	>50~60	>60~70	>70~80	>80~90	>90~125	>125~150
≥30~100										
>100~200										
>200~300										375mg
>300~400									450mg	525mg
>400~500							375mg	375mg	525mg	600mg
>500~600						375mg	450mg	450mg	600mg	
>600~700		225mg			375mg	450mg	450mg	525mg		
>700~800	225mg	225mg	300mg	375mg	450mg	450mg	525mg	600mg		
>800~900	225mg	225mg	300mg	375mg	450mg	525mg	600mg			
>900~1,000	225mg	300mg	375mg	450mg	525mg	600mg				
>1,000~1,100	225mg	300mg	375mg	450mg	600mg					
>1,100~1,200	300mg	300mg	450mg	525mg	600mg					
>1,200~1,300	300mg	375mg	450mg	525mg						
>1,300~1,500	300mg	375mg	525mg	600mg						

2週間毎投与の表に該当しない場合には
4週間毎投与の表に従い投与すること

投与不可

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0.008mg/kg/□IU/mL□□□□2□□□□□□□□□□□□□□0.016mg/kg/□IU/mL□□□□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□

PFS□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□

Image

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/xolair/pollinosis/capacity*