□□□□2.□□□Ⅲ□□□□□□□□IA05□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Nocturnal asthma symptom score □□□□□□□□□□□□□□□□52□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□≧200μg/□ FP□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


ゾレア又はプラセボ
吸入ステロイド薬と２剤以上の喘息治療薬
ステロイド固定期
用量一定
ステロイド調整期
用量調整可
スクリーニング期
（1 週間）
観察期
（8 週間）
24週間
28 週間
追跡調査
（16 週間）
投与開始
52 週間
投与終了

4. □□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□□□□□

□3□□□□□□JAT□□□□□□□□□□□□□[3]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0.73□□□□□□□□□□□□□1.15□□□□□□□□□□□□□□□□p=0.034□□□□□□□□□□□□□

Image



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

PFS□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

IC□□□□□□□□□□□□

IC□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

IgE□□□□□□

Image

Source URL:
https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/xolair/asthma/clinical_child_02