NOVARTIS

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□


【図】 6ヵ月間のリンパ球数の推移 〔国内第Ⅱ相試験〕
(/mm³)
3,000
2,000
1,000
0
リンパ球数(平均値)
ジレニア0.5mg (n=57)
ジレニア1.25mg*(n=54)
プラセボ (n=57)
ベースライン
15日
1ヵ月
2ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
投与期間
〔社内資料：国内第Ⅱ相試験（D1201試験）〔承認時評価資料〕〕

※□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□3,500/mm^3□□□□□□□□□□□□□800/mm^3□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Ⅲ□□□□□□□□□□□□□□□□□TRANSFORMS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□TRANSFORMS□□□□□□□□□12□□□□□□□□□□□□□□12□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□3,500/mm^3□□□□□□□□□□□□□800/mm^3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□1.25mg※□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/gilenya/point/subeffect_03*