□□□□□□□□□ [HAWK]

□□□□□□□□□□□□□□AMD□

□□□□□□□□□□□□□III□□□□HAWK□C001□□□□□□□

□□□□48□□

□□□□□

48□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3mg□22.3□□80/358□□□□□□□□6mg□22.2□□80/360□□□□□□□□□□□□□2mg□17.8□□64/360□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3mg□7.5□□27/358□□□□□□□□6mg□5.6□□20/360□□□□□□□□□□□□2mg□4.4□□16/360□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1.1□□4/358□□□1.7□□6/360□□□0□□0/360□□□□□□□□□□□□0.8□□3/358□□□1.4□□5/360□□□0.8□□3/360□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

有害事象の概要［48週］			
	発現例数（%）		
	ベオビュ 3mg群 (n=358)	ベオビュ 6mg群 (n=360)	アフリベルセプト 2mg群 (n=360)
治療対象眼での有害事象	175 (48.9)	179 (49.7)	170 (47.2)
重篤な有害事象	5 (1.4)	11 (3.1)	3 (0.8)
治験薬との関連あり	3 (0.8) ※1	5 (1.4) ※2	1 (0.3) ※3
治験薬投与手技との関連あり	2 (0.6) ※4	2 (0.6) ※5	1 (0.3) ※6
投与中止に至った有害事象	10 (2.8)	9 (2.5)	10 (2.8)
眼以外の有害事象	242 (67.6)	232 (64.4)	258 (71.7)
重篤な有害事象	47 (13.1)	47 (13.1)	68 (18.9)
治験薬との関連あり	1 (0.3) ※7	0 (0.0)	2 (0.6) ※8
治験薬投与手技との関連あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
投与中止に至った有害事象	1 (0.3)	3 (0.8)	7 (1.9)

1□□□

□□□

96□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3mg□1.7□□6/358□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□6mg□0.05mL□□4□□□□1□□□□3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□