□□□□□□□□□[HARRIER]

□□□□□□□□□□□□□AMD□

□□□III□□□□HARRIER□C002□□□□□□□□□□□□□□□

□□□48□□

□□□□□

48□□□□□□□□□□□□□□□

有害事象の概要［48週］		
	発現例数（%）	
	ベオビュ6mg群 (n=370)	アフリベルセプト2mg群 (n=369)
治療対象眼での有害事象	122 (33.0)	119 (32.2)
重篤な有害事象	9 (2.4)	4 (1.1)
治験薬との関連あり	7 (1.9) ※1	1 (0.3) ※2
治験薬投与手技との関連あり	2 (0.5) ※3	0 (0.0)
投与中止に至った有害事象	8 (2.2)	4 (1.1)
眼以外の有害事象	219 (59.2)	211 (57.2)
重篤な有害事象	35 (9.5)	43 (11.7)
治験薬との関連あり	1 (0.3) ※4	0 (0.0)
治験薬投与手技との関連あり	1 (0.3) ※5	0 (0.0)
投与中止に至った有害事象	4 (1.1)	0 (0.0)

1□□□

Image

有害事象の概要［96週］		
	発現例数（%）	
	ベオビュ6mg群 (n=370)	アフリベルセプト2mg群 (n=369)
治療対象眼での有害事象	174 (47.0)	176 (47.7)
重篤な有害事象	13 (3.5)	6 (1.6)
治験薬との関連あり	8 (2.2) ※1	2 (0.5) ※2
治験薬投与手技との関連あり	4 (1.1) ※3	1 (0.3) ※4
投与中止に至った有害事象	13 (3.5)	6 (1.6)
眼以外の有害事象	282 (76.2)	272 (73.7)
重篤な有害事象	69 (18.6)	85 (23.0)
治験薬との関連あり	1 (0.3) ※5	1 (0.3) ※6
治験薬投与手技との関連あり	0 (0.0)	0 (0.0)
投与中止に至った有害事象	8 (2.2)	3 (0.8)

1□□□