NOVARTIS

レクビオ□02-1 具体的な患者像

具体的な患者像：このような患者さんはいらっしゃいますか?

心血管イベント直後で経過観察中の患者さん

Image

心血管イベント（心筋梗塞）を起こし緊急入院

【入院前】
スタチン服用　LDL-C値130mg/dL

治療薬	LDL-C値	LDL-C 管理目標値
スタチン最大耐用量 + エゼチミブ※1	90mg/dL	70mg/dL未満※2

- 急性心筋梗塞は**二度と経験したくない**
- 医師にすすめられたとおりに治療強化したが、LDL-C管理目標値を達成できておらず**不安**

※1 急性冠症候群ガイドライン（2018年改訂版）で推奨される治療1)
※2 「急性冠症候群」、「家族性高コレステロール血症」、「糖尿病」、「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞（ 明らかなアテロームを伴うその他の脳梗塞を含む）」の4病態のいずれかを合併する場合に考慮する2)

1）日本循環器学会 急性冠症候群ガイドライン（2018年改訂版）2022年12月9日更新, p91
2）日本動脈硬化学会 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p69, 71

レクビオを使用できる方

以下のすべてにあてはまり、レクビオの投与が適すると医師が判断した場合に使用できます。

- 家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症
- 心血管イベントの発現リスクが高い
- HMG-CoA還元酵素阻害剤による治療で効果が不十分である又は副作用などによりHMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/leqvio/patients/profile*