□VEGF□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□VEGF□□□□□□□□□□□□□□□

□DME□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

Image

Image

□□□□□2024□5□13□□□□

□□□□□□□□□DME□□□□□□□□□□□□□□□□VEGF□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

図1 滲出型加齢黄斑変性（nAMD）またはDME患者さんにおける治療関連の優先事項についての選択型コンジョイント分析結果（海外データ）



目的：VEGF阻害薬治療を受けたnAMD患者またはDME患者を対象に、治療関連の優先事項を調査する。
対象：VEGF阻害薬治療を受けたnAMD患者またはDME患者、計300例
研究デザイン：前向き
解析計画：離散選択型コンジョイント分析を行った。効用値は多項ロジスティック回帰分析とNelder-Meadシンプレックス法により求めた。相対的重要性は、治療に関連する各属性の効用値幅（効用値の最高値から最低値を引いたもの）を5属性全体の効用値幅の合計で割って、パーセントで示した。相対的重要性は年齢層のサブグループ別に算出した。
安全性：文献中に記載なし。

□Bhagat D, et al. Clin Ophthalmol 2020; 14: 2975-2982. □□□□

図2
患者さん向けの冊子
ご存知ですか?
医療費サポート

□□□

□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/beovu/dr-interview/dr_hirano*