CAPS□□□□□□□□ ①□□□□□□□□□□□□□□□□□□Ⅱ□/A2102□□□□□□□□□2□□□□□□□□□2□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□　□□□□2□□□□□□□□□□□□□16□□□□□□□□□□□□□□□□1□150mg□4□16□□□□□5□□□□1□2mg/kg□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Ⅲ□/D2306□□□20□□□□□□□Ⅲ□/D2304□□□27□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□1)　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□3□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□150mg□□□□□□□16□□□□□□□□□□□□□□2□9□□□□29□□28□□96.6□□□2mg/kg□□□□□□□16□□□□□□□□□□□□□□2□8□□□□5□□□□□□□□□□□□□□150mg□□2mg/kg□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□115.2□□□48.6□□□□□□□□□

Image



用量・用法	症例数	投与期数*	再燃までの期間の推定中央値（日）	再燃までの期間 95%信頼区間（日）
150mg s.c.	29	96	115.2	94.1～136.4
2mg/kg s.c.	4	22	48.6	29.3～67.9

*各症例の投与期の数の合計

□4□□□□□□□□□□□□□□□□□CRP□SAA□□□□□□

CRP□□SAA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□CRP□SAA□□10mg/L□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

評価時点		CRP(mg/L)			SAA(mg/L)		
		(n=34)	150mg s.c. (n=29)	2mg/kg s.c. (n=5)	(n=34)	150mg s.c. (n=29)	2mg/kg s.c. (n=5)
	ベースライン	21.6 (122%)			52.7 (127%)		
初回投与～初回再燃まで	投与後1日	–	21.4 (102%)	3.9 (180%)	–	53.9 (125%)	10.3 (182%)
	投与後1週	–	2.4 (88%)	0.5 (135%)	–	3.7 (81%)	1.4 (93%)
	投与後5週	–	2.9 (161%)	0.8 (128%)	–	7.0 (216%)	1.5 (125%)
	最終評価時	–	11.0 (116%)	5.3 (130%)	–	25.5 (110%)	14.3 (116%)
全投与期の平均	投与後1日	–	14.2 (121%)	3.3 (148%)	–	32.5 (125%)	11.5 (132%)
	投与後1週	–	2.6 (106%)	0.8 (169%)	–	4.8 (150%)	2.9 (141%)
	投与後5週	–	3.5 (141%)	0.8 (135%)	–	6.7 (179%)	1.9 (126%)
	最終評価時	–	10.1 (116%)	3.5 (105%)	–	21.7 (133%)	9.9 (120%)

幾何平均(変動係数%)

□5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□150mg□□□□□□□16□□□□□□□□□□2mg/kg□□□□□□□16□□□□□□□□□5□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□

□6□□□□

□□□□34□□13□□38.2□□□□□□□□□□□□□□□□□18□□□□□□□27□□8□□29.6□□□4□17□□□□7□□5□□□□□□□□□□□□□□18□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□III□/D2308□□□□□

□

□2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□III□/D2306□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/ilaris/caps/clinical_02*