

111

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

111

TNF α mRNA 在 N2301 组中表达量较 169 组增加 8 倍, 为 47 $\pm$ 27.8 倍, 差异有统计学意义 ($P=0.013$)。7.7% 的 N2301 组患者血清中检测到 TNF α 抗体, 而 169 组患者血清中未检测到 TNF α 抗体, 差异有统计学意义 ($P=0.030$)。

□□□□□□□□□□

Image

副作用評価対象例数	TRAPS 43例
副作用発現例数	13例
副作用発現症例率	30.2%

副作用の種類	発現例数 (%)
胃腸障害	2 (4.7)
腹痛	1 (2.3)
嘔吐	1 (2.3)
一般・全身障害および投与部位の状態	4 (9.3)
注射部位そう痒感	1 (2.3)
注射部位紅斑	1 (2.3)
注射部位反応	4 (9.3)
感染症および寄生虫症	5 (11.6)
下気道感染	1 (2.3)
気管支炎	1 (2.3)
上気道感染	1 (2.3)
中耳炎	1 (2.3)
鼻咽頭炎	3 (7.0)

副作用の種類	発現例数(%)
眼障害	1 (2.3)
眼瞼炎	1 (2.3)
筋骨格系および結合組織障害	1 (2.3)
筋力低下	1 (2.3)
血液およびリンパ系障害	1 (2.3)
好中球減少症	1 (2.3)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	1 (2.3)
口腔咽頭痛	1 (2.3)
皮膚および皮下組織障害	2 (4.7)
汗腺炎	1 (2.3)
発疹	1 (2.3)

赤字：国内でもみられた副作用

承認時社内集計

0

Source URL: https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/ilaris/traps/clinical_02