


Image



□□□□□□□□

表5-1 推奨作成のための、エビデンス総体の総括
(アウトカム全般のエビデンスの強さ)

A(強)	効果の推定値に強く確信がある
B(中)	効果の推定値に中程度の確信がある
C(弱)	効果の推定値に対する確信は限定的である
D(とても弱い)	効果の推定値がほとんど確信できない

「監修:福井次矢・山口直人, 編集:森實敏夫・吉田雅博・小島原典子, Minds診療ガイドライン作成の手引き2014. 医学書院, 2014」より引用

Image

- 例)
- 1) 患者Pに対して治療 I を行うことを推奨する(1A)
=(強い推奨、強い根拠に基づく)
 - 2) 患者Pに対して治療 C にくらべ治療 I を行うことを提案する(2C)
=(強い推奨、弱い根拠に基づく)
 - 3) 患者Pに対して治療 C も治療 I も行わないことを提案する(2D)
=(弱い推奨、とても弱い根拠に基づく)
 - 4) 患者Pに対して治療 I を行わないことを強く推奨する(1B)
=(強い推奨、中程度の根拠に基づく)

「監修:福井次矢・山口直人, 編集:森實敏夫・吉田雅博・小島原典子, Minds診療ガイドライン作成の手引き2014. 医学書院, 2014」より引用

□□□□

- 1) Curatolo P, et al. Eur J Paediatr Neurol 2012; 16: 582-586
- 2) Moavero R et al. Childs Nerv Syst 2010; 26:1495-1504
- 3) Wu JY, et al. Neurology. 2010; 74: 392-398
- 4) Jansen FE et al. Epilepsia. 2007; 48: 1477-1484
- 5) Kossoff EH et al. Epilepsia. 2005; 46: 1684-1686
- 6) Krueger DA, et al. N Engl J Med 2010; 363: 1801-1811

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/afinitor/tsc/guideline_03