NOVARTIS

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□**BC**□

□□□□**BC**□

□□□□BC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□□**RCC**□

□□□□□□**RCC**□

□□□□□□RCC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□



□□□□□□□□**(NET)**

□□□□□□□□**(NET)**

□□□□□□□□(NET)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□



- 結節性硬化症と新たに診断したあるいは疑った時の検査のレコメ

遺伝子　脳　腎臓　肺　皮膚

MRI検査により皮質結節、上衣下結節（SEN）、遊走異常、上衣下
（SEGA）の存在を評価する。

節性硬化症関連神経精神症状（TAND）*を評価する。

回診断までに発現はなくとも、乳児期には点頭てんかんを見逃さない
年齢に行う。

□□□□□□□TSC□

□□□□□□□TSC□

□□□□□□□TSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/afinitor/material*