

タシグナ[®] を投薬される 医師、薬剤師の先生方へ

服薬指導のお願い

タシグナ[®] の用法及び用量

通常、成人にはニロチニブとして1回400mgを食事の1時間以上前又は食後2時間以降に1日2回、12時間毎を目安に経口投与する。ただし、初発の慢性期の慢性骨髄性白血病の場合には、1回投与量は300mgとする。なお、患者の状態により適宜減量する。

通常、小児には体表面積に合わせて次の投与量（ニロチニブとして1回約230mg/m²）を食事の1時間以上前又は食後2時間以降に1日2回、12時間毎を目安に経口投与する。

なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1回投与量
0.32m ² 以下	50mg
0.33～0.54m ²	100mg
0.55～0.76m ²	150mg
0.77～0.97m ²	200mg
体表面積	1回投与量
0.98～1.19m ²	250mg
1.20～1.41m ²	300mg
1.42～1.63m ²	350mg
1.64m ² 以上	400mg

★食後に本剤を投与した場合、本剤の血中濃度が増加するとの報告があります。食事の影響を避けるため、食事の1時間前から食後2時間までの間の服用は避けてください。


⇒「服用時間の例」は、裏面をご覧ください

患者さんへの十分な服薬指導をお願い申し上げます。

本剤の「効能又は効果」「用法及び用量」「警告・禁忌を含む使用上の注意」「効能又は効果に関連する使用上の注意」「用法及び用量に関連する使用上の注意」につきましては、添付文書をご参照ください。

タシグナ[®] 服用時間の例 朝9時と夜9時(21時)に服用する場合

- 食後2時間以降に服用します。
- 食事の1時間以上前に服用します。
- 1日2回、12時間毎を目安に服用します。



※ タシグナ[®]の用法及び用量につきましては、表面をご参照ください。

タシグナ[®]の服薬指導にお役立ていただくための、各種資材をご用意しています。
ノバルティスファーマ株式会社 MRへお問い合わせください。