

# ゾメタ点滴静注4mg/5mLの使用方法

本品は点滴静注用となっております。

下記の通り使用して下さい。

## ●用法・用量

### 1.悪性腫瘍による高カルシウム血症

通常、成人にはゾレドロン酸として4mgを日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液(5%)100mLに希釈し、15分以上かけて点滴静脈内投与する。なお、再投与が必要な場合には、初回投与による反応を確認するために少なくとも1週間の投与間隔をおくこと。


### 2.多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変

通常、成人にはゾレドロン酸として4mgを日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液(5%)100mLに希釈し、15分以上かけて3~4週間間隔で点滴静脈内投与する。

## ●調製方法


1

注射筒の針をゴム栓の中央に刺入し  
内容物を吸引する。



2

日局生理食塩液又は  
日局ブドウ糖注射液(5%)100mL  
に希釈する。



## 適用上の注意

- 1) 投与速度：15分間以上かけて点滴静脈内投与すること。
- 2) 外観に異常を認めた場合には使用しないこと。
- 3) カルシウム及びマグネシウムを含有する点滴用液と混合しないこと。
- 4) 調製後は24時間以内に使用すること。  
調製後すぐに使用しない場合は、2~8°Cに保存し、使用する前に室温に戻してから使用すること。