

# ボルタレン<sup>®</sup>ゲル1%

をご使用中の患者さまへ

## 使用方法

- 痛いところとその周辺に、まんべんなくうすく塗りひろげてください。
- お風呂上りに使用すると、より効果的です。

## 使用量の目安

- 1回の使用量は患部により異なりますが、下の図を参考にしてください。
- 通常は1日3～4回の使用です。

<1回の使用量の目安> 肩・ひじ・ひざ・・・2～3cm  
腰 ……3～5cm



## この薬の情報

この薬について、インターネットでもご覧いただけます。

URL : [www.novartis.co.jp](http://www.novartis.co.jp)

携帯電話用QRコード⇒



VGL029GG

## 注 意

- 眼や粘膜(口の中など)、きず口には使用しないでください。  
また、このお薬を使用した手で、そのまま眼や粘膜、きず口にふれることのないように注意してください。
- 使用により、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 塗ったところが白くなることがありますが、引き続きご使用いただいても問題はありません。  
(厚く塗ったり、塗りむらがあったりすると、白く見えることがあります。これはお薬の一部が乾いて白く見えるためです。)
- このお薬を塗った上からラップなどで、おおわないようにしてください。
- 使用後は必ずキャップをしめ、直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 合成樹脂を軟化したり、塗料を溶かしたり、金属を変色させることがあるので注意して下さい。
- 小児の手のとどかないところに保管してください。

