

## リアメット配合錠

### 【この薬は？】

販売名	リアメット配合錠 RIAMET Combination Tablets
一般名	アルテメテル・ルメファントリン Artemether・Lumefantrine
含有量 (1錠中)	アルテメテル 20mg・ルメファントリン 120mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗マラリア剤です。
- ・この薬にはアルテメテルとルメファントリンという成分が含まれており、両成分とも、赤血球内に侵入したマラリア原虫の食胞内において作用し、抗マラリア活性を発揮します。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### マラリア

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると本来の効果が得られないことがあります。指示通りに飲むことが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にリアメット配合錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・妊婦(妊娠 14 週未満)又は妊娠している可能性のある人
- ・次の薬を使用している人

リファンピシン (リファジンなど)、カルバマゼピン (テグレトールなど)、フェノバルビタール (フェノバルなど)、フェニトイン (アレビアチン、ヒダントール)、リファブチン (ミコブティン)、ホスフェニトイン (ホストイン)

- ・次の食品を使用している人

セイヨウオトギリソウ (St. John's wort、セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・QT 延長を起こしやすい人 (先天性 QT 延長症候群のある人、心疾患のある人、低カリウム血症や低マグネシウム血症のある人など)
- ・妊婦 (妊娠 14 週以降)
- ・授乳中の人

○妊娠する可能性のある人では、この薬を使用する前に妊娠検査を行い、妊娠していないことを確認することがあります。

○この薬には併用してはいけない薬 (上記の「○次の人は、この薬を使用することはできません。」の項を参照) や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの体重や、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

体重	5kg 以上 15kg 未満	15kg 以上 25kg 未満	25kg 以上 35kg 未満	35kg 以上
一回量	1 錠	2 錠	3 錠	4 錠
飲む回数	初回、初回から 8 時間後、その後は 1 日 2 回朝夕を 2 日間 計 6 回 食直後に飲みます			

- ・下痢または嘔吐のある人ではこの薬の吸収が低下する可能性があります。この薬を飲んでから 1 時間以内に嘔吐した場合には、再度この薬を飲んでください。

### ●どのように飲むか？

- ・コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

- ・決して 2 回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

### ●多く使用した時 (過量使用時) の対応

- ・異常を感じたら、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・意識障害や臓器不全を伴う重症マラリアの人では、この薬の効果が十分に得られない可能性があるため、他の治療が検討されることがあります。
- ・妊娠する可能性のある人は、この薬を使用している間および使用終了から最初の月経までの間は適切な避妊を行ってください。
- ・QT 延長があらわれることがあります。特に QT 延長のリスクのある人では、心電図モニターなどが行われます。QT 延長の症状があらわれた場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。
- ・下痢または嘔吐が認められている急性マラリアの人では、他の治療が検討されますが、この薬を使用する場合には、血液中のマラリア原虫数を確認しながら使用されます。
- ・妊婦（妊娠 14 週未満）または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。妊婦（妊娠 14 週以降）は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・グレープフルーツジュースはこの薬の効果に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
QT延長 きゅーていーえんちよう	めまい、動悸（どうき）、気を失う
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、息苦しい、動悸

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき
頭部	めまい、気を失う
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

## 【この薬の形は？】

形状	黄色の片面割線入りの素錠 
直径	9mm
厚さ	3.2mm
重さ	240mg
色	黄色
識別コード	CG NC

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	アルテメテル・ルメファントリン
添加剤	セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウム、ポリソルベート 80、無水ケイ酸

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ノバルティス ファーマ株式会社

(<https://www.novartis.co.jp/>)

ノバルティスダイレクト

電話：0120-003-293

受付時間：月～金 9時～17時30分

（祝日及び当社休日を除く）